

26.10.2017, Antalya

TARD 2017- Obstetrik Anestezi Bilimsel Kurulu (OABK) Toplantı Tutanağı

Obstetrik Anestezi Bilimsel Kurulu (OABK) TARK-2017 sırasında 26.10.2017 tarihinde saat 18.00-19.00'da Mira Salonunda yapılan toplantı, OABK Başkanı Prof.Dr.Berrin Günaydın'ın açılış konuşmasıyla başladı. OABK üyeleri ile toplantıya katılanların tanışmasının ardından toplantı gündeminde 2017 yılında gerçekleştirilen faaliyetler özetlendi ve yeni dönemde yapılacaklar için katılımcıların görüş ve önerileri dinlenerek tartışıldı:

2016-2017 dönemini toplantısının özeti:

1. 2017 yılında TARD websitesi Akademi bölümünde OABK adına Prof. Dr Hakkı Ünlügenç ve çalışma grubu tarafından hazırlanan Vajinal Doğumda Nöroaksiyel Analjezi' kılavuzunun e-kitap olarak yayınlandığı belirtildi. Ayrıca yine TARD Akademi'de OABK adına Prof.Dr.Tülay Özkan Seyhan ve Prof.Dr.Berrin Günaydın tarafından birer adet ayın makalesi yayınlandığı belirtildi.
2. Prof. Dr. Fevzi Toraman ve Prof. Dr. Hülya Bilgin başkanlığında **Hasta Kan Yönetimi**'nde olduğu gibi **Kanamalı Cerrahilerde Hematolojik Sorunlar ve Çözümler** başlıklı Farkındalık Toplantılarının da TARD'ın yedi şubesinde yapılacağı takvim belirtildi. TARK 2017 sırasındaki Obstetrik Anestezi oturumlarından Annelerde Hüzünlü Sevinç adlı panelin bu farkındalık toplantılarının içeriğini yansıtır nitelikte olacağını söyledi.
3. Akılcı oksitosin kullanımı ile ilgili TARD websitesin'de online olarak yapılmış olan anket sayısı (n=93) yeterli olmadığı için kongre sırasında bu sayının bire bir anket dağıtımı ile artırılması planlandı (n=50 anket dağıtıldı) .
4. Karboprost (PGF2alfa) ve Karbetosin (PABAL) kullanımı, ruhsat alımı, Türkiye'de reçete edilmesi ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulunuldu.
5. KTÜ'den Dr. Engin Ertürk, Doğum analjezisinde neler yapıyoruz?' konulu bir anket yapılması ile levobupivakain ve ropivakaine erişebilirlik konusunda Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilmesi konusunda öneride bulundu.
6. Dicle Üniversitesi'nden Dr. Zeynep Baysal Yıldırım; anne ölümlerine dikkat çekerek, Diyarbakır'da bir ay içinde 4 anne ölümü olduğunu ve oluşturdukları bir whats app grubuyla iletişime geçerek kendi bölgelerinde obstetrik kanamalara takım halinde yaklaştıklarını bildirdi.

7. Ege Üniversitesi'nden Prof.Dr. Semra Karaman; obstetrik anestezi, kadın-doğum ekibi ve kan bankası temsilcilerinden oluşan bir ekiple ortak proje yapılması önerisinde bulundu.
8. Dicle Üniversitesi'nden Dr. Abdulmenap Güzel; bir PPH yönetimi kılavuz hazırlanması önerisinde bulundu.
9. Atatürk Üniversitesi'nden Dr. Ayşenur Dostbil; doğum analjezisinde farkındalık konusuna değindi.
10. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof.Dr. E. Bengi Şener; spinal anesteziye bağlı hipotansiyonun tedavisinde efedrin (bazı merkezlerde yok) veya fenilefrin (ülkemizde yok) ve efedrin olmadığında noradrenalin kullanımı ile ilgili tecrübelerini paylaşarak bu konuda anket ve kılavuz hazırlanması önerisinde bulundu.
11. Medipol Üniversitesi'nden Dr. Arzu Köse; kılavuzların dernek sayfasında olmasının anesteziistlerin kendilerini savunabilmelerinde önemine değindi.
12. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden Dr. Nuray C. Eryılmaz; PPH'de kolloid kullanımı, ve oksitosin aşırı dozu konularına dikkat çekti.
13. Kanuni Sultan EAH'den Dr. Naime Yalçın da doğum analjezisinde anket yapılması önerisinde bulundu.
14. Prof.Dr Hakkı Ünlügenç; Karbetosin ve karboprost hakkında bilgi verdi. Anesteziistlerin doğum analjezisi yapılıp yapılmaması konusunda karar vermesi gerektiğini belirtti (ağrısız doğumu artırmak/sezaryen oranlarını azaltmak için). Spinal anesteziye bağlı hipotansiyonun önlenmesi ve tedavisi hakkında anket ve kılavuz gerektiğini ve plasenta akretada hasta kan yönetimi konusunun gelecek kongrelerde konuşulması önerildi.
15. Prof. Dr. Berrin Günaydın; CEEA modüllerinden Modül IV: Anne-çocuk İstenmeyen Etkiler modülünün 11-12 Kasım 2017'de Ankara'da yapılacağı duyurusunu yaptı.


Özetle anketler, kılavuzlar, simülasyonlar ve eğitim önerilerinde bulunuldu. TJOD ile işbirliğinin sürdürülmesi, çok merkezli çalışmalar planlanması ve devamlı iletişimde bulunulması konusunda fikir birliğine varıldı.

Prof.Dr.Berrin Günaydın (Başkan)


Prof.Dr.Tülay Özkan Seyhan (Başkan Yard.)

Prof.Dr.Tülay Şahin (Sekreter)

Meslek hayatınızda kaç yıldır çalışıyorsunuz
(n=191)




Şu anda çalıştığınız kurum
(n=191)




Elektif sezaryen operasyonunda, bebek çıktıktan sonra standart
sympitan (oksitosin) parenteral uygulama pratiğiniz nedir?

(n=191)




Elektif sezaryen operasyonunda, bebek çıktıktan sonra kaç Ü
Synpitan (oksitosin) rutini uygulamaktasınız?

(n=191)




Synpitan 40 Ü İV infüzyon /500 mL Ringer laktat solüsyonunda 125 mL/st hızda*


Elektif sezaryen operasyonunda, bebektiktikn sonra IV bolus Sympitan'ı (oksitosin) hangi hızda uygulamaktasınız?
(n=191)




Oksitosin uygulaması sırasında gebede hangi yan etkileri beklersiniz?
(birden çok seçeneğe işaretleyebilirsiniz)




Elektif sezaryen operasyonunda, bebek çıktıktan sonra Sypitan (oksitosin) infüzyonunu nasıl uygulamaktasınız?
(n=191)




Elektif sezaryen operasyonunda, bebek çıktıktan sonra optimal/maksimum oksitosin dozlarına karşın uterus tonusu yeterli değilse öncelikli hangi uygulamayı tercih edersiniz?




Sezaryen sırasında rutin metilergonovini (metiler/uterjin) uyguluyor musunuz?
(n=191)



Metilergonovini hangi yolla uyguluyorsunuz?
(n=191)



Elektif olmayan sezaryen operasyonunda sonrasypitan (oksitosin) uygulaması için daha objektif kriterler gereklidir? (n=191)



Metilergonovin uygulaması sırasında gebede hangi yan etkileri beklersiniz? (birden çok seçeneği işaretleyebilirsiniz)

